

外国人新冠病毒预防疫苗接种指南

新冠疫苗接种前后注意事项

接种前

- ▲健康状态良好时接种
- ▲接种前必须接受医生预诊
- ▲有下列情况延期接种
 - .疑似感染新冠的，延期接种
 - .隔离中的新冠患者或接触者，延期接种
 - .发热(37.5℃ 以上)等有急性病的，延期接种

接种后

- ▲接种后在接种机构停留15-30分钟，观察有无异常反应发生，后3个小时注意观察
- ▲接种后一周避免高强度运动及活动
- ▲保持接种部位清洁

接种新冠疫苗后可能发生的异常反应

- ▲接种后会发生接种部位疼痛，浮肿,红肿，发热，疲劳感，头痛，肌肉痛，发冷,恶心等症
- ▲会出现呼吸困难，脸部浮肿，眼睛或口部口腔浮肿等严重的过敏症状
- ▲辉瑞，摩登纳疫苗接种后，会出现胸口疼痛，压迫感，不舒服，呼吸困难或喘气呼吸时疼痛，心跳过快，悸动，昏迷等症状，会发生心肌炎，心包炎症状

新冠疫苗接种后异常反应发生情况

- ▲接种部位浮肿，疼痛的，用干净的干毛巾在上面冷敷

▲有微热的情况，充分的摄取水分，休息

▲因发热或肌肉疼痛不舒服的，服用解热镇痛剂

.接种前准备有乙酰氨基苯成分的解热镇痛剂，接种后出现浑身难受的症状情况服用解热镇痛剂

▲出现以下症状请接受医生诊疗

.胸痛，压迫感，不舒服，呼吸困难或喘气呼吸时疼痛，心跳过快，悸动，昏厥等症状新发生或持续恶化的情况

.接种部位疼痛，浮肿，红肿或发热等2天不见好转或恶化的情况

.新冠疫苗接种后突然疲惫或与平时比出现其他异常症状的时候

▲呼吸困难或严重的头晕的，嘴部脸部浮肿，全身严重麻疹的症状出现的情况，联系119
或来医院急救室

疑似异常反应发生的情况，请垂询1339或管辖区的保健所，或预防接种帮扶世家 (<http://nipkda.go.kr>) 在 '예

방접종 후 건강상태 확인하기可确认异常反应和应对方法